



MANEJO DE LA HEPATITIS C EN PACIENTES HEMOFÍLICOS


Dra. Marisa Montes Ramírez
Medicina Interna 2
Hospital La Paz



Programa

- Tratamiento de la hepatitis C
- Retratamiento de la hepatitis C y nuevos fármacos
- Vivir con hepatitis C crónica

Tratamiento Hepatitis C





Tratamiento de la hepatitis C

- Objetivo: Erradicación de la infección por VHC.
- El tratamiento es eficaz en el 55% los casos:
 - 45% genotipo 1, 4
 - 65% genotipo 2, 3



Tratamiento de la hepatitis C

- ¿Quién debe tratarse?
- Mayores de 18 años
- Con transaminasas alteradas
- Con daño hepático demostrado
- Sin alteraciones graves en los análisis completos.
- Pacientes con cirrosis que nunca hayan tenido una complicación.



Tratamiento de la hepatitis C

- ¿Quién debe tratarse?


DEBE SER SIEMPRE UNA DECISIÓN
CONSENSUADA ENTRE PACIENTE Y MÉDICO.

LA ÚLTIMA PALABRA LA TIENE EL PACIENTE.

Tratamiento de la hepatitis C

- El tratamiento de elección es:
interferón alfa pegilado (semanal) y

ribavirina (diario)






Tratamiento de la hepatitis C

- La duración del tratamiento debe ser de 48 semanas en genotipo 1, 4.
- La duración del tratamiento debe ser de 48 semanas en genotipo 2, 3.



Tratamiento de la hepatitis C





Tratamiento de la hepatitis C

- Respuesta semana 12
- Respuesta semana 24
- Respuesta fin tratamiento
- Respuesta sostenida (curación)



Efectos adversos

**Aproximadamente un
15-30% de los
pacientes abandonan
la terapia combinada
por efectos adversos**




Efectos secundarios

- Interferón
 - S.pseudogripal
 - Psiquiátricos
 - Analíticos
 - Constitucionales
 - Neurológicos
 - Autoinmunes
 - Dermatológicos
 - Respiratorios
 - Cardiovasculares




Efectos secundarios

- Ribavirina
 - Anemia hemolítica / 2^a a mielosupresión
 - Anorexia Náuseas / Vómito
 - Cefalea / Insomnio / Depresión
 - Teratogenicidad
 - Tos / Disnea / Congestión nasal
 - Rash / Prurito / Sequedad piel y mucosas
 - Hiperuricemia



PREGUNTAS ¿?

Retratamiento Hepatitis C





Retratamiento Hepatitis C

- Tipo de respuesta al primer tratamiento.
- Tipo de tratamiento recibido.
- Gravedad de la hepatitis C.
- Genotipo y cantidad de virus C.
- Tolerancia y cumplimiento del primer tratamiento.



Retratamiento Hepatitis C

- Tratados con interferón clásico

REAPARECE EL VIRUS

Tratar con interferón pegilado y ribavirina



Retratamiento Hepatitis C

- Tratados con interferón clásico

SIN RESPUESTA PREVIA

Tratar con interferón pegilado y ribavirina
los pacientes más avanzados



Retratamiento Hepatitis C

- Tratados con interferón clásico y ribavirina

SIN RESPUESTA

**Tratar con interferón pegilado y ribavirina no
menos de 48 semanas**



Retratamiento Hepatitis C

- Tratados con interferón pegilado y ribavirina

SIN RESPUESTA

Tratar con interferón pegilado y ribavirina sólo cuando el primer tratamiento no fue óptimo por alguna circunstancia



Retratamiento hepatitis C

**Aproximadamente un
10-20% de los
pacientes que se
vuelven a tratar
consiguen la curación**



Retratamiento Hepatitis C

- LA DECISIÓN DEL RETRATAMIENTO ES COMPLEJA.
- ES FUNDAMENTAL VALORAR MUY BIEN LAS OPCIONES DE RESPUESTA Y LA URGENCIA DEL RETRATAMIENTO.



Nuevas terapias

- Inhibidores de proteasa:
 - telaprevir, boceprevir.
- Inhibidores de polimerasa
- Albuferón: interferón unido a albúmina, posología 2-4 semanas.
- Otros: nitazoxanida, sylimarin



Nuevas terapias

- TELAPREVIR

- 1 comprimido cada 8 horas
- Siempre se acompaña de interferón pegilado y ribavirina



Nuevas terapias

- BOCEPREVIR


- 1 comprimido cada 8 horas
- Siempre se acompaña de interferón pegilado y ribavirina



Nuevas terapias


- NITAZOXANIDA

- 1 comprimido cada 12 horas
- Siempre se acompaña de interferón pegilado y ribavirina



PREGUNTAS ¿?

Vivir con hepatitis C crónica





Vivir con hepatitis C crónica

- DIETA

- No consumir alcohol
- Café 2 tazas al día
- Evitar el sobrepeso



Vivir con hepatitis C crónica

■ MEDICAMENTOS

- Cuidado con los medicamentos que se eliminan por el hígado.
- Si existe enfermedad avanzada no tomar más de 2 gramos de paracetamol al día.



Vivir con hepatitis C crónica

- EJERCICIO FÍSICO

- Sin restricciones



Vivir con hepatitis C crónica

- RELACIONES SEXUALES

- Sin restricciones en parejas heterosexuales estables.
- Riesgo de contagio aumentado en homosexuales.



Vivir con hepatitis C crónica

■ RELACIONES SOCIALES


- No compartir útiles de afeitado, depilación ni higiene bucal.
- Sin restricciones otros aspectos de la convivencia.



Vivir con hepatitis C crónica

- MATERNIDAD Y LACTANCIA

- 5% riesgo de transmisión de la madre al niño.
- Sin restricciones para la lactancia materna.



PREGUNTAS ¿?